

## 循環器官用薬

### 2 個々の器官系用医薬品

#### 21 循環器官用薬

##### 211 強心剤

アカルディ〔ベーリンガーインゲルハイム〕
カプセル剤(粉碎可):1.25mg(¥121.1)・2.5mg(¥213.4)
ビモベンダン

【用法・用量】急性心不全:1回2.5mg,1日2回まで,必要に応じてジギタリス製剤等を併用,慢性心不全:1回2.5mg,1日2回,ただしジギタリス製剤,利尿薬等と併用  
【重大な副作用】1)心室細動,2)心室頻拍,心室性期外収縮,3)肝機能障害・黄疸  
【効能・効果】(1)次の状態で,利尿剤等を投与しても十分な心機能改善が得られない場合:急性心不全(2)次の状態で,ジギタリス製剤,利尿剤等の基礎治療剤を投与しても十分な効果が得られない場合:慢性心不全(軽症～中等症)

アンナカ(安息香酸ナトリウムカフェイン)〔メルク〕
末:原末(¥9.2)
安息香酸ナトリウムカフェイン

【用法・用量】1回0.1～0.6g,1日2～3回  
【効能・効果】ねむけ,倦怠感,血管拡張性及び脳圧亢進性頭痛(片頭痛,高血圧性頭痛,カフェイン禁断性頭痛など)

カフェイン〔メルク〕
末(¥9.7)
カフェイン <span style="float: right;">Aus:A, FDA:B</span>

【用法・用量】1回0.1～0.3g,1日2～3回  
【効能・効果】ねむけ,倦怠感,血管拡張性及び脳圧亢進性頭痛(片頭痛,高血圧性頭痛,カフェイン禁断性頭痛など)

カルゲート〔田辺〕
錠剤(粉碎可):10mg(¥73.6)・5mg(¥42.8)
デノバミン

【用法・用量】1日15～30mg,3回分服,多くの場合ジギタリス,利尿薬,血管拡張薬併用  
【重大な副作用】心室頻拍  
【効能・効果】慢性心不全

ジギトキシン〔塩野義〕
錠剤(粉碎可):0.025mg(¥9.7)
ジギトキシン <span style="float: right;">Aus:A, FDA:C</span>

【用法・用量】比較的急速飽和療法(飽和量1.2～1.8mg):1回0.2mg,1日3回,2～3

日,緩徐飽和療法:1回0.1mg,1日3回,4~6日続ける,維持:1日0.05~0.1mg,小児急速飽和療法:2歳以上0.02~0.04mg/kg,2歳以下0.04~0.06mg/kg,1~2日経口投与,維持:飽和量の1/10量

**【禁忌】**(1)房室ブロック・洞房ブロック(2)ジギタリス中毒(3)閉塞性心筋疾患(4)本剤の成分又はジギタリス剤に対し過敏症の既往歴

**【重大な副作用】**ジギタリス中毒

**【効能・効果】**(1)次の疾患に基づくうっ血性心不全(肺水腫,心臓喘息等を含む):先天性心疾患,弁膜疾患,高血圧症,虚血性心疾患(心筋梗塞,狭心症等),肺性心(肺血栓・塞栓症,肺気腫,肺線維症等によるもの),その他の心疾患(心膜炎,心筋疾患等),腎疾患,甲状腺機能亢進症並びに低下症等(2)心房細動・粗動による頻脈,発作性上室性頻拍(3)次の際における心不全及び各種頻脈の予防と治療:手術,急性熱性疾患,出産,ショック,急性中毒

ジゴシン〔中外〕	
散剤:0.1%(¥12.9)	
ジゴキシソ	Aus:A, FDA:C

**【用法・用量】**急速飽和療法(飽和量1~4mg):初回0.5~1mg,以後0.5mgを6~8時間毎,維持量:1日0.25~0.5mg,小児飽和療法:2歳未満1日0.06~0.08mg/kg,3~4回分服,2歳以上1日0.04~0.06mg/kg,3~4回分服,維持療法:飽和量の1/5~1/3量

**【禁忌】**(1)房室ブロック・洞房ブロック(2)ジギタリス中毒(3)閉塞性心筋疾患(4)本剤の成分又はジギタリス剤に対し過敏症の既往歴

**【重大な副作用】**ジギタリス中毒:高度の徐脈・二段脈・多源性心室性期外収縮・発作性心房性頻拍,重篤な房室ブロック,心室性頻拍症,心室細動

**【効能・効果】**(1)次の疾患に基づくうっ血性心不全(肺水腫,心臓喘息等を含む):先天性心疾患,弁膜疾患,高血圧症,虚血性心疾患(心筋梗塞,狭心症等),肺性心(肺血栓・塞栓症,肺気腫,肺線維症等によるもの),その他の心疾患(心膜炎,心筋疾患等),腎疾患,甲状腺機能亢進症並びに低下症等(2)心房細動・粗動による頻脈(3)発作性上室性頻拍(4)次の際における心不全及び各種頻脈の予防と治療:手術,急性熱性疾患,出産,ショック,急性中毒

タウリン〔大正富山〕	
散剤:1g/1.02g/P(¥10.9)	
アミノエチルスルホン酸	

**【用法・用量】**1回1g,1日3回,うっ血性心不全には強心利尿薬と併用

**【効能・効果】**(1)高ビリルビン血症(閉塞性黄疸を除く)における肝機能の改善(2)うっ血性心不全