




17. 痛風・高尿酸血症治療薬



痛風発作予防薬

一般名・成分名 商品名・発売元	規格	標準用法用量	主な効能効果・注意事項
コルヒチン Colchicine コルヒチン錠 Colchicine 塩野義	内：(●) 0.5mg/T 本・青・三・柏  ¥8.90 割線あり	1日3～4mg, 6～8分服 発病予防：1日0.5～1mg 発作予感時：1回0.5mg	【効】 痛風発作の緩解および予防 【禁】 妊婦 【重大な副作用】 再生不良性貧血, 顆粒球減少, 白血球減少, 血小板減少, 横紋筋融解症, ミオパチー, 末梢神経障害

尿酸排泄促進薬

ブコローム Bucolome パラミチンカプセル Paramidin あすか	内：(●) 300mg/C 本・青・三・柏  ¥18.60	(1),(2)1日600～1200mg, 2～4分服 リウマチ疾患には1日900～1200mg (3)1日300～900mg	【効】 (1)手術後及び外傷後の炎症・腫脹の緩解 (2)下記疾患の消炎・鎮痛・解熱 リウマチ疾患, 変形性関節症, 膀胱炎, 多形滲出性紅斑, 急性副鼻腔炎, 急性中耳炎, 子宮付属器炎 (3)痛風の高尿酸血症の是正 【禁】 消化性潰瘍のある患者, 重篤な血液の異常・肝障害・腎障害のある患者, アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作の誘発)又はその既往歴のある患者
プロベネシド Probenecid ベネシッド錠 Benecid 科研	内：250mg/T 本・柏  ¥9.70	(1)1日0.5～2gを分割投与後, 維持量1日1～2g, 2～4分服 (2)1日1～2g, 4分服	【効】 (1)痛風 (2)ペニシリン・パラアミノサリチル酸の血中濃度維持 【禁】 腎臓結石症又は高度の腎障害・血液障害のある患者, 2才未満の乳児, 授乳 【重大な副作用】 溶血性貧血, 再生不良性貧血, アナフィラキシー様反応, 肝壊死, ネフローゼ症候群
ベンズブロマロン Benzbromarone ユリノーム錠 Urinorm 鳥居	内：(●) 50mg/T 本・青・三・柏  ¥34.10 割線あり	(1)1日1回25～50mgより開始 維持量：1回50mg, 1日1～3回 (2)1回50mg, 1日1～3回	【効】 下記における高尿酸血症の改善 (1)痛風 (2)高尿酸血症を伴う高血圧症 【警告】 (1)劇症肝炎等の重篤な肝障害が主に投与開始6ヶ月以内に発現し, 死亡等の重篤な転帰に至る例も報告されているので, 投与開始後少なくとも6ヶ月間は必ず定期的に肝機能検査を行うなど観察を十分に行い, 肝機能検査値の異常, 黄疸が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと (2)副作用として肝障害が発生する可能性があることをあらかじめ患者に説明するとともに, 食欲不振, 悪心・嘔吐, 全身倦怠感, 腹痛, 下痢, 発熱, 尿濃染, 眼球結膜黄染等があらわれた場合には, 本剤の服用を中止し, 直ちに受診するよう患者に注意を行うこと 【禁】 肝障害のある患者, 腎結石を伴う患者, 高度の腎機能障害のある患者, 妊婦, 授乳 【重大な副作用】 重篤な肝障害

尿酸生成抑制薬

一般名・成分名 商品名・発売元	規格	標準用法用量	主な効能効果・注意事項
アロプリノール Allopurinol アロシトール錠 Alositol 田辺	内：100mg/T 本・青・三  ¥25.90 割線あり	1日200～300mg,2～3分服	【効】 下記の場合における高尿酸血症の是正 痛風,高尿酸血症を伴う高血圧症 【禁】 授乳 【重大な副作用】 皮膚粘膜眼症候群,中毒性表皮壊死症・剥脱性皮膚炎等の重篤な発疹,過敏性血管炎,ショック,アナフィラキシー様症状,再生不良性貧血,汎血球減少,無顆粒球症,血小板減少,重篤な肝機能障害,黄疸,腎障害,間質性肺炎,横紋筋融解症
ザイロリック錠 Zyloric グラクソ・スミスクライン	内：100mg/T 本・青・三・柏  ¥30.20 割線あり		

④投与中は患者の状態を十分観察し,定期的に臨床検査を行うことが望ましい。