神経系に作用する薬剤

01　麻酔薬

0101　局所麻酔薬（エステル型）

（アミノ安息香酸エチル）

▶アミノ安息香酸エチル軟膏10%「マルイシ」　後 院外専用

Ethyl aminobenzoate 10%500g/瓶

〔丸石〕

〔薬価〕2.29円/g

【効】次の疾患における鎮痛・鎮痒：外傷，熱傷，日焼け，皮膚潰瘍，そう痒症，痔疾

【用】（外）適宜患部に使用

【禁】本剤に対し過敏症

……

（プロカイン塩酸塩）

▶ロカイン注1%　劇 オーダ未登録

Rocain　〔扶桑〕

〔薬価〕92.00円/A

【効】伝達麻酔

【用】（注）10 ～ 400mgを使用．必要に応じアドレナリン（濃度1：10万～ 20万）を添加

【禁】重篤な出血やショック状態（硬膜外麻酔時），注射部位又はその周辺の炎症（硬膜外麻酔時），敗血症（硬膜外麻酔時），メトヘモグロビン血症，本剤又は安息香酸エステル（コカインを除く）系局所麻酔剤に対し過敏症．次の場合は血管収縮剤（アドレナリン，ノルアドレナリン）を添加しない：血管収縮剤に対し過敏症，高血圧，動脈硬化，心不全，甲状腺機能亢進，糖尿病，血管痙攣，耳・指趾・陰茎の麻酔（伝達〈脊椎麻酔を除く〉麻酔）

【重副】ショック，振戦・痙攣等の中毒症状

……

0102　局所麻酔薬（アミド型）

（ブピバカイン塩酸塩水和物）

▶マーカイン注脊麻用0.5%高比重　劇 オーダ未登録

Marcain 20mg4mL/A

〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕438.00円/A

▶マーカイン注脊麻用0.5%等比重　劇 オーダ未登録

Marcain 20mg4mL/A

〔薬価〕438.00円/A

【効】脊椎麻酔（腰椎麻酔）

【用】（注）1回10 ～ 20mgを脊髄クモ膜下腔に注入．1回20mgまで

【禁】大量出血やショック状態，注射部位又はその周辺に炎症，敗血症，本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症，中枢神経系疾患：髄膜炎，灰白脊髄炎，脊髄癆等，脊椎に結核，脊椎炎及び転移性腫瘍等の活動性疾患

【重副】ショック，振戦，痙攣，異常感覚，知覚・運動障害

……

（メピバカイン塩酸塩）

▶カルボカイン注1%　劇 オーダ未登録

Carbocain 1%100mL/V

〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕11.30円/mLV

▶カルボカインアンプル注1%　劇 オーダ未登録

Carbocain 1%10mL/A

01

〔薬価〕109.00円/A
【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸潤麻酔
【用】(注) 基準最高用量は，それぞれ1回500mg．麻酔方法別の用量：①100～300mg．②50～200mg，指趾神経遮断には40～80mg．③20～400mg
【禁】[共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔）] 本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症．[硬膜外麻酔] 大量出血やショック状態，注射部位又はその周辺に炎症，敗血症
【重副】ショック，意識障害，振戦，痙攣，異常感覚，知覚・運動障害

……

(メピバカイン塩酸塩)

▶カルボカインアンプル注2% 劇 (オーダ未登録)

Carbocain 2%10mL/A
〔アストラゼネカ〕
〔薬価〕166.00円/A
【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸潤麻酔
【用】(注) 基準最高用量は，それぞれ1回500mg．麻酔方法別の用量：①200～400mg．②40～400mg，指趾神経遮断には80～160mg．③40～400mg
【禁】[共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔）] 本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症．[硬膜外麻酔] 大量出血やショック状態，注射部位又はその周辺に炎症，敗血症
【重副】ショック，意識障害，振戦，痙攣，異常感覚，知覚・運動障害

……

(リドカイン)

▶キシロカインポンプスプレー8% 劇 後 (オーダ未登録)

Xylocaine 80g/本 〔アストラゼネカ〕
〔薬価〕23.70円/g
【効】表面麻酔
【用】(外) 8～40mg（1～5回の噴霧）を使用
【禁】本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症
【重副】ショック，意識障害，振戦，痙攣

……

(リドカイン)

▶ペンレステープ18mg 劇 (オーダ未登録)

Penles (18mg) 30.5mm×50.0mm/枚
〔マルホ〕
〔薬価〕45.70円/枚
【効】①静脈留置針穿刺時の疼痛緩和．②伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和
【用】(外) ①1回1枚，静脈留置針穿刺予定部位に約30分間貼付．②小児：1回2枚までを，伝染性軟属腫摘除予定部位に約1時間貼付
【禁】本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症
【重副】ショック，アナフィラキシー様症状

……

(リドカイン塩酸塩)

▶キシロカインビスカス2% 劇

Xylocaine 2%100mL/本
〔アストラゼネカ〕
〔薬価〕6.00円/mL
【効】表面麻酔
【用】(内) 1回100～300mg（5～15mL：添付の匙でほぼ1～3杯又は注射筒に吸引して使用）を1日1～3回
【禁】本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症
【重副】ショック，意識障害，振戦，痙攣

……

（リドカイン塩酸塩）

▶キシロカイン注射液0.5%　劇　オーダ未登録

Xylocaine 100mL/V〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕10.00円/mLV

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸潤麻酔

【用】（注）1回200mgを基準最高用量とする．①25～150mg．交感神経遮断：25～100mg．②15～200mg．指趾神経遮断：15～50mg．肋間神経遮断：25mgまで．③10～200mg

【禁】[共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔・表面麻酔）] 本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症．[硬膜外麻酔] 大量出血やショック状態，注射部位又はその周辺に炎症，敗血症

【重副】[共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔・表面麻酔）] ショック，意識障害，振戦，痙攣．[硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔] 異常感覚，知覚・運動障害，悪性高熱

……

（リドカイン塩酸塩）

▶キシロカイン注射液1%　劇　オーダ未登録

Xylocaine 100mL/V〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕11.00円/mLV

▶キシロカイン注ポリアンプ1%　劇　オーダ未登録

Xylocaine 100mg10mL/A

〔薬価〕103.00円/A

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸潤麻酔．④表面麻酔

【用】（注）1回200mgを基準最高用量とする．①100～200mg．②30～200mg．指趾神経遮断：30～100mg．肋間神経遮断：50mgまで．③20～200mg．④適量を塗布又は噴霧

【禁】[共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔・表面麻酔）] 本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症．[硬膜外麻酔] 大量出血やショック状態，注射部位又はその周辺に炎症，敗血症

【重副】[共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔・表面麻酔）] ショック，意識障害，振戦，痙攣．[硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔] 異常感覚，知覚・運動障害，悪性高熱

……

（リドカイン塩酸塩）

▶キシロカイン注ポリアンプ2%　劇　オーダ未登録

Xylocaine 200mg10mL/A

〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕148.00円/A

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸潤麻酔．④表面麻酔

【用】（注）1回200mgを基準最高用量とする．①200mg．②40～200mg．指趾神経遮断：60～120mg．③40～200mg．④適量を塗布又は噴霧

【禁】[共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔・表面麻酔）] 本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症．[硬膜外麻酔] 大量出血やショック状態，注射部位又はその周辺に炎症，敗血症

【重副】[共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔・表面麻酔）] ショック，意識障害，振戦，痙攣．[硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔] 異常感覚，知覚・運動障害，悪性高熱

……

（リドカイン塩酸塩）

▶キシロカインゼリー2%　院内専用

Xylocaine 2%30mL/本〔アストラゼネ

カ〕
〔薬価〕8.00円/mL
【効】表面麻酔
【用】(外) 尿道麻酔には男子は200～300mg（10～15mL），女子は60～100mg（3～5mL），気管内挿管には適当量
【禁】本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症
【重副】ショック，意識障害，振戦，痙攣

……

（リドカイン塩酸塩）

▶キシロカイン液「4%」
（オーダ未登録）
Xylocaine 4%20mL/本
〔アストラゼネカ〕
〔薬価〕13.80円/mL
【効】表面麻酔
【用】(外) 80～200mg（2～5mL）を使用.
〈使用方法〉
耳鼻咽喉科領域：鼻腔内，咽喉に刺激性薬物を塗布する前処置，耳管カテーテル挿入，下甲介切除，鼻中隔矯正，扁桃剔出，咽喉頭鏡検査等の場合，本剤の適量（一時に5mL〈リドカイン塩酸塩として200mg〉以内）を塗布又は噴霧.
泌尿器科領域：膀胱鏡検査，尿管カテーテル挿入，逆行性腎盂撮影法，凝血除去，結石処置，経尿道式尿道乳頭腫剔除等の場合，本剤を倍量に希釈し，その約10mL（リドカイン塩酸塩として200mg）を尿道内に注入し，男子では陰茎を箝搾子ではさみ，女子には綿栓を施して5～10分間，液を尿道内に貯留させる.
気管支鏡検査：全身麻酔時の挿管には本剤を倍量に希釈し，その適量（10mL〈リドカイン塩酸塩として200mg〉以内）を噴霧
【禁】本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症
【重副】ショック，意識障害，振戦，痙攣

……

（リドカイン塩酸塩）

▶キシロカイン点眼液4%
（オーダ未登録）
Xylocaine 4%20mL/本
〔アストラゼネカ〕
〔薬価〕16.20円/mL
〔貯法〕遮光，禁凍結，15℃以下
【効】眼科領域における表面麻酔
【用】(外) 1～5滴を点眼
【禁】本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症
【重副】(類薬) ショック

……

（ロピバカイン塩酸塩水和物）

▶アナペイン注2mg/mL 0.2% 劇
Anapeine 200mg100mL/袋
〔アストラゼネカ〕
〔薬価〕1,627.00円/袋
【効】術後鎮痛
【用】(注) 手術終了時に12mg/時を硬膜外腔に持続投与. 8～20mg/時の範囲で適宜増減
【禁】大量出血やショック状態，注射部位又はその周辺に炎症，敗血症，本剤成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症
【重副】ショック，意識障害，振戦，痙攣，異常感覚，知覚・運動障害

……

（ロピバカイン塩酸塩水和物）

▶アナペイン注7.5mg/mL 0.75% 劇
（オーダ未登録）
Anapeine 75mg10mL/A〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕609.00円/A
【効】麻酔（①硬膜外麻酔．②伝達麻酔）
【用】(注) ①1回150mgまでを硬膜外腔に．②1回300mgまでを目標の神経あるいは神経叢近傍に
【禁】[共通（硬膜外麻酔，伝達麻酔）] 本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症．［硬膜外麻酔］大量出血やショック状態，注射部位又はその周辺に炎症，敗血症
【重副】ショック，意識障害，振戦，痙攣，異常感覚，知覚・運動障害

▶キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1：100,000）含有 (劇)

Xylocaine 200mg20mL/V
〔アストラゼネカ〕
〔薬価〕11.00円/mLV
〔貯法〕遮光，禁凍結，15℃以下

1mL中：	
リドカイン塩酸塩	10mg
アドレナリン	0.01mg

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸潤麻酔．④表面麻酔
【用】(注) 1回50mL（塩酸リドカインとして500mg）を基準最高用量とする．() 内は塩酸リドカインとして，〈〉内はアドレナリンとしての用量である．① 10 ～ 30 mL（100 ～ 300 mg）〈0.1 ～ 0.3 mg〉．② 3 ～ 20 mL（30 ～ 200 mg）〈0.03 ～ 0.2mg〉．肋間神経遮断には5 mLまで（50mgまで）〈0.05mg〉．③2 ～ 40 mL（20 ～ 400 mg）〈0.02 ～ 0.4 mg〉．④適量を塗布又は噴霧
【禁】[共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔・表面麻酔）] 本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症，高血圧，動脈硬化，心不全，甲状腺機能亢進，糖尿病，血管攣縮の既往，狭隅角や前房が浅いなど眼圧上昇の素因のある患者（眼科領域等の麻酔に用いる場合）．次の薬剤を投与中：ブチロフェノン系・フェノチアジン系等の抗精神病薬，α遮断薬，イソプロテレノール等のカテコールアミン製剤，アドレナリン作動薬．［硬膜外麻酔］大量出血やショック状態，注射部位又はその周辺に炎症，敗血症．［伝達麻酔・浸潤麻酔］耳，指趾又は陰茎の麻酔を目的とする患者
【原則禁】心室頻拍等の重症不整脈，交感神経系作動薬に対し過敏症，精神神経症，コカイン中毒
【併用禁】抗精神病薬（ブチロフェノン系，フェノチアジン系，イミノジベンジル系，ゾテピン，リスペリドン等）（セレネース，トロペロン，ウインタミン，デフェクトン，ロドピン，リスパダール等），α遮断薬（プラゾシン等）（ミニプレス等），カテコールアミン製剤，アドレナリン作動薬（プロタノール等）
【重副】[共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔・表面麻酔）] ショック，意識障害，振戦，痙攣，肺水腫，呼吸困難，心停止．［硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔］異常感覚，知覚・運動障害，悪性高熱

▶歯科用キシロカインカートリッジ (劇)(オーダ未登録)

Xylocaine 1.8mL/A
〔デンツプライ三金〕
〔薬価〕76.00円/A
〔貯法〕遮光，禁凍結，15℃以下

1mL中：	
リドカイン塩酸塩	20mg
アドレナリン	0.0125mg